

Syringa x prestoniae

Lilas de Preston



Preston's Lilac



Feuilles :

obovales ; revers aux nervures très marquées

Été : vert foncé au dessous grisâtre


Fleurs :

gros panicule à pointe retombante ; floraison environ 2 semaines après les lilas communs

Couleur : fleurs rose-mauve

Saison : été

Odeur : léger parfum



Fruits :

sans intérêt

Espacement requis :

sans restriction



Famille : Oléacées

Forme : arbuste

Zone de rusticité : 2 a

Croissance : rapide

Exposition : soleil

Hauteur : 3 m

Largeur : 3 m

Valeur ornementale : élevée

Aspect : port buissonnant, évasé ; couronne à la base étroite et à la cime large ; branches érigées

Disponibilité : bonne

Usages : isolé, écran et massif ; plante intéressante par sa floraison

Sol :

Humidité : élevée, moyenne ou faible

Texture : argileuse, loameuse, sableuse ou organique

pH : acide, neutre ou alcalin

Compactage : tolérance

Sel de déglacage : tolérance

Sol : sols mi-lourds et riches

Enracinement : enracinement superficiel ; plantation facile

Taille : une taille légère des fleurs fanées immédiatement après la floraison avantage la formation et la qualité de la plante en phase juvénile ; sur les vieux sujets, cette opération est seulement esthétique

Maladies : peu de problèmes pathologiques : balais de sorcière

Insectes : peu de problèmes entomologiques : kermès

Remarques :

bonne rusticité, nombreuses variétés toutes de taille comparable, floraison aux tons roses et pourpres

Variétés horticoles :

page suivante

