

Aesculus glabra

Marronnier de l'Ohio



Espacement requis :

5 m



Famille : Hippocastanacées

Forme : petit arbre

Zone de rusticité : 3 b

Croissance : lente

Exposition : soleil ou mi-ombre

Hauteur : 8 m

Largeur : 6 m

Valeur ornementale : faible

Aspect : port globulaire ; couronne sphérique, irrégulière ; branches érigées en tous sens ; écorce noirâtre et écailleuse chez les vieux individus

Disponibilité : bonne

Usages : isolé, massif et alignement

Sol :

Humidité : moyenne

Texture : loameuse

pH : légèrement acide

Compactage : tolérance moyenne

Sel de déglacement : tolérance moyenne

Sol : sols profonds et bien drainés

Enracinement : enracinement profond

Taille : tailler avec modération au printemps

Maladies : légère sensibilité : carie blanche, taches, roussissures

Insectes : peu de problèmes entomologiques

Remarques :

très rustique, seul marronnier pouvant être utilisé jusqu'au Lac St-Jean

Ohio Buckeye

Feuilles :

palmées, composées de 5 folioles sessiles ;
10 à 15 cm de longueur

Été : vert foncé

Automne : rouge orangé




Fleurs :

épis érigés sans grand intérêt

Couleur : jaune verdâtre

Saison : été



Fruits :

marrons toxiques

Saison : automne

Fructification : abondante

Utilisation animale : écureuils

